



安泰醫療社團法人安泰醫院

感管通訊

第 29 期

中華民國 104 年 05 月 12 日

發行人：蔡宗昌 院長

編輯：盤香婷感管護理師

發行：感染管制委員會

分機：3055、3056、3057

本土首例麻疹！需注意防範

國內今年截至目前共 2 例麻疹確定病例，1 例為國內感染，1 例為中國大陸移入病例；去年同期共計 12 例，2 例國內感染，10 例境外移入（菲律賓 5 例，中國大陸 2 例，印尼、馬來西亞及越南各 1 例）。疾管署呼籲，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後 4 天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。另民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。



麻疹簡介	
何謂麻疹	- 由麻疹病毒(measles virus)引起的高傳染性呼吸道疾病。 - 人類是唯一宿主。 - 主要藉由空氣、飛沫或直接接觸病人含有病毒之鼻咽腔分泌物感染。 - 好發於冬末及春季。
防治措施	- 預防接種：注射含麻疹活性減毒的疫苗後，可以使95%以上的人產生主動免疫。 1. 兒童：出生滿12個月及滿5歲至入國小前各接種一劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。 2. 醫護人員：如婦產科、小兒科、急診等高風險單位人員無疫苗接種紀錄或抗體陰性者建議接種二劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。 3. 育齡婦女、未曾接種、接種史不清楚、抗體陰性者建議接種二劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。 1歲以下嬰兒：應避免前往麻疹流行地區。 1-6歲之學齡前幼兒，未完成MMR疫苗接種者：應於接種MMR疫苗兩週後再前往。 - 年齡介於18至30歲之大專院校教職員生、軍人、醫事機構及教托育機構人員：強烈建議接種MMR疫苗兩週後再前往。

由於麻疹容易由頻繁之國際交流，如旅遊、探親、商務活動等管道進入國內，並在不具免疫力的族群間快速傳播。疾管署提醒，應避免攜帶未滿1歲及未完成MMR疫苗接種之嬰幼兒前往麻疹流行地區，家中如有滿1歲之幼兒應儘速攜往衛生所或合約院所完成MMR疫苗接種，以降低感染機會；如為自然感染免疫者不需再施打疫苗。

在此呼籲，平時應注意個人衛生，加強洗手頻率、避免以手接觸口鼻，當出入人潮密集地區可戴口罩加強自我防護，如出現發燒、鼻炎、結膜炎及紅疹等症狀，請勿自行服藥，而應儘速就醫，並告知醫師近期旅遊史及相關接觸史。相關資訊歡迎至疾管署全球資訊網（<http://www.cdc.gov.tw>）或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

安泰感染管制室關心您