



安泰醫療社團法人安泰醫院

感控通訊

第 36 期

發 行 人：黃炳生 院長
發 行：感染管制委員會

中華民國 105 年 04 月 27 日

編輯：盤香婷 感管護理師
分機：3055、3056、3057

遠離老鼠，漢他病毒不由牠！

依據疾管署監測資料顯示，國內今年截至目前共3例漢他病毒出血熱病例，均位於高雄市，前2例為家庭群聚，本個案雖與前2例不同里別，但兩地相距約400公尺。

漢他病毒出血熱由感染漢他病毒引起，為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為齧齒類動物，尤其是環境中常見的老鼠，人一旦吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，即可能受到感染。潛伏期數天至兩個月，一般可能會出現的症狀包括發燒、頭痛、倦怠、腹痛、下背痛、噁心、嘔吐、不等程度出血現象並侵犯腎臟等。

落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不政策可有效預防感染漢他病毒，餐飲業、市場、食品工廠等應特別注重環境清潔與衛生，並採取相關防鼠滅鼠措施；民眾平時應留意生活周遭老鼠可能入侵的途徑，家中廚餘或動物飼料應妥為處理，同時清除老鼠可能躲藏的死角，如倉庫、儲藏室等。清理鼠類排泄物時，應先配戴口罩及橡膠手套，並用稀釋漂白水（10 公升清水+100cc 市售漂白水）或酒精進行噴灑，待消毒作用 30 分鐘後再行清理，以策安全。

漢他病毒簡介

什麼是漢他病毒症候群？
由漢他病毒所引起的人畜共通傳染病，依臨床症狀分為兩種：

- 漢他病毒出血熱 (HFRS)**
三大臨床表徵
發燒
血小板減少
急性腎衰竭
- 漢他病毒肺症候群 (HPS)**
早期症狀為發燒、疲倦和嚴重的肌肉痛，伴隨有頭痛、胃部不適等現象，快速進展至呼吸衰竭與休克。

傳染媒介
鼠類動物為主要宿主
(臺灣主要為溝鼠及錢鼠)

傳染方式

- 吸入有漢他病毒鼠類分泌物(包括糞、尿、唾液等)之飛沫。
- 接觸遭病毒污染的物體。
- 遭帶病毒之鼠類動物咬傷。
- 很少人傳人。

潛伏期

- 漢他病毒出血熱：12~16天。
- 漢他病毒肺症候群：6天至數週之間，平均約2週。

京尤醫資訊

當身體出現發燒、出血、急性腎衰竭等症狀，且曾接觸鼠類動物的排泄物或遭其咬傷時，請儘速就醫並主動告知醫師相關動物接觸史等訊息，以及早獲得妥適的治療。

安泰感染管制室關心您