



安泰醫療社團法人安泰醫院

感控通訊

第 42 期

中華民國 106 年 05 月 24 日

發行人：黃炳生 院長

編輯：沈秋香 感管護理師

發行：感染管制委員會

分機：3055、3056、3057

高雄出現今年首例日本腦炎確定病例， 民眾做好防蚊措施並接種疫苗

疾病管制署公布今年首例日本腦炎確定病例，為一名高雄市 50 歲男性，5 月 11 日開始出現肢體無力、發燒及解尿困難至醫院就醫，5 月 16 日症狀惡化併意識改變轉醫學中心收治、5 月 18 日通報，並於 5 月 22 日經檢驗確認為今年首例日本腦炎病例，目前個案意識恢復住院治療中。

台灣日本腦炎流行季集中在每年 5 月至 10 月，6 至 7 月為流行高峰。依據疾管署監測資料顯示國內今年截至目前共 1 例確定病例；2012 至 2016 年確定病例數分別為 32、16、18、30 及 23 例。

接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，家中如有滿 15 個月以上未完成疫苗接種之嬰幼兒，照顧者應儘速帶往各地衛生所或合約院所完成接種，以避免感染，衍生嚴重後遺症。此外，成人如住家或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境或自覺有感染風險者，皆可前往衛生福利部部立醫院等醫療院所自費接種。

國內傳播日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用衛生福利部核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。相關資訊可至疾病管制署全球資訊網

(<http://www.cdc.gov.tw>) 或撥打免付費防疫專線 1922 (或 0800-001922) 洽詢。

日本 腦炎



三斑家蚊
白頭斑蚊、環蚊家蚊

症狀



頭痛



少數發燒



肢體麻痺



意識改變



抽蓄



嘔吐



居家環境
保持整潔



臥室、起居
掛蚊帳
裝紗門



避免在黃昏、
黎明活動



著長袖、長褲
身體裸露處塗防蚊液



接種
日本腦炎疫苗

預防

衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC



www.cdc.gov.tw



1922防疫達人
www.facebook.com/TWCDCC

疫情通報及關懷專線：1922

廣告

以上資料來源：疾病管制署

安泰醫院感染管制室關心您