

放射線治療期間的飲食原則

一部分癌症病人,經過放射線治療或化學治療後,會產生腹瀉,口乾,噁心等副作用,導致食慾不振,體重減輕,無法維持良好身體狀態,故出現下列幾項癌症期間飲食原則,可以幫助患者渡過難關。

→ 對於有腹瀉的癌症病人應注意:

- 1. 避免吃會產生氣,粗糙,多纖維的食物,例如:綠色蔬菜,青椒,芹菜,水果等。
- 2. 避免酸的水果,牛乳及乳製品。
- 3. 選用含鉀較多的食品,例如:瘦肉(魚,豬,羊,火雞),鮪魚, 皇帝豆,菠菜,香蕉,橘子等。
- 4. 可食玉米粉,太白粉煮的羹,有助於止瀉。
- 5. 少用油,以菜湯,果汁供給水份。
- 6. 心理作用亦會引起腹瀉。

→ 對於口乾的患者在飲食方面需注意:

- 1. 半流質狀態或流質的食物較易於吞嚥。
- 2. 應避免太甜,太熱,含酒精的飲料。
- 3. 茶中加檸檬,多喝水。

→ 對於治療期間有噁心,嘔吐情形時:

- 1. 在進行治療前數小時禁食。
- 2. 鹹味食物如鹹橄欖,話梅,蘇打餅乾等以及冰冷飲料對預防 此類副作用有幫助,
- 3. 禁用過甜,油膩的食物,如甜點,油煎油炸的東西。
- 4. 避免忽冷忽熱的混合食物,易刺激嘔吐。
- 5. 採少量多餐,例如雨,三小時進食一次。
- 6. 吃完東西後應靜臥休息。

資料來源:安泰醫院放腫科/護理部

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • •	• • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
<u>:</u>	護	理	衛	教	簽	收	聯
衛教名稱:放射線治療期間的飲食原	則						

中華民國:_____年____月____日