

Jardiance 用藥指導衛教單

編號：C1110

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每錠)
恩排糖	Jardiance	empagliflozin	10 mg/tab
恩排糖	Jardiance	empagliflozin	25 mg/tab

二、作用：

第二型糖尿病治療。

三、如何服用本藥品：

(1)請依照醫師指示服用藥品。

(2)JARDIANCE 的建議劑量為每日早上一次、每次 10 mg，可與食物一起服用，亦可空腹服用。當耐受性良好，劑量可提升至 25 mg。

四、若忘記服藥該怎麼辦？

請告知病患務必依照處方服用 JARDIANCE。若錯過一劑藥物，請儘速於記起時立刻服用，請勿於下一劑時服用雙倍劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
併用胰島素與胰島素促泌劑時發生的低血糖(極度飢餓感心悸、顫抖、持續發冷、冒冷汗、昏亂、頭痛等)	如有低血糖症狀，應立即進食含糖飲料(如果汁、糖水、方糖；若未改善，則應送急診。)
嚴重低血糖發生痙攣，昏迷時	不可進食並立即送急診
泌尿道感染和生殖器黴菌感染、低血壓、腎功能惡化	請立即就醫

六、注意事項：

(1) JARDIANCE 與胰島素或磺醯尿素類藥物併用時，低血糖的發生率會上升。

(2) 為使糖尿病受到良好控制，請遵醫囑控制飲食，飲酒量，檢查血糖、糖化血紅素及尿糖，運動應規律，避免高血糖或低血糖產生。

(3) 服用本藥前有下列事項請告知醫師：懷孕或準備懷孕，哺乳，曾有藥物過敏，其他疾病或同時服用其他藥物。以利醫師決定是否應用藥。

(4) 服用 JARDIANCE 時尿液分析中的尿糖升高為正常現象。

(5) 對於所有糖尿病療法的反應，均必須藉由定期測量血糖與 HbA1c 濃度進行監測，目的是將這些數值降至正常範圍。HbA1c 監測對於長期血糖控制狀況的評估尤其有用。

七、藥品該如何存放？

請儲存於 30°C 以下。請存放於兒童無法取得的安全處所。

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)
1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)