

# 安泰醫療社團法人安泰醫院 藥劑科衛教單張

## Metformin 口服降血糖藥用藥指導衛教單

編號：C114

### 一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每錠)
國嘉濾糖素錠	Glucosamine (Lvtangsu)	Metformin	500mg/tab
生達伏糖膜衣錠	GLUCOPHAGE (Loditon)	Metformin	850MG/TAB

### 二、作用：

(1)用來治療第二型(非胰島素依賴型)糖尿病病人，促進體內胰島素作用，來降低血糖

### 三、如何服用本藥品：

(1)由較低劑量開始，逐漸增加用量，且隨餐或餐後立即服用，可減少胃腸方面如腹瀉、噁心、嘔吐、脹氣等副作用

### 四、若忘記服藥該怎麼辦？

想起時儘快服用。但如果想起時接近下次的服藥時間，則跳過一次。而照原來時間服用下一次的劑量。絕不可一次服用二次的劑量。

### 五、可能產生的副作用及處理方式：

(1)乳酸血症為極少發生，但極嚴重之副作用。於腎或肝功能不佳、缺氧、飲酒過度、脫水等病人較易發生。服藥一段時間後，若發生胃腸不適，應注意是否為乳酸血症的初期症狀。如有不明之換氣過度、肌肉疼痛或嗜眠等症狀，應立即停藥就診。

(2)單獨服用時，一般不會引起低血糖，但與硫醯基尿素類、胰島素或酒精併用時，有可能產生低血糖(心悸、冒冷汗、極度飢餓感、頭痛)。輕度時立即吃含糖飲料或食物，如果汁、糖水或方糖。如未見改善，則應送急診。如嚴重時發生痙攣、昏迷，不可進食，應立即送急診。

(3)初期發生之腸胃不適，可由較低劑量逐漸增加用量或隨餐服用而減輕，通常連續服用後不適症狀會消失，如嚴重腹瀉或嘔吐，則需暫時停藥。

### 六、注意事項：

(1)為使糖尿病受到良好控制，請遵醫囑控制飲食、飲酒量，運動應規律，定期檢查血糖、糖化血色素及尿糖，及腎臟功能檢查。

(2)飲食及運動應規律，定量且定時。避免飲酒過量，以穩定控制血糖。

(3)懷孕期間建議使用胰島素控制血糖，授乳應告知醫師，由醫師決定停止授乳或停藥

(4)於手術進食期間暫時停藥。恢復進食後且腎功能正常，再恢復給藥。

(5)若因放射檢查須使用顯影劑，請告知醫師正使用 **Metformin** 此類藥物。

### 七、藥品該如何存放？

儲存於 15~25 度之乾燥環境下

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)