

安泰醫療社團法人安泰醫院 藥劑科衛教單張

DIGOXIN 用藥指導衛教單

編號：C121

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每錠)
隆我心	DIGOXIN	Digoxin	0.25mg/tab

二、作用：

毛地黃主要是用於治療心臟衰竭及心臟跳動異常。有時臨床上有其他用途，必要時請詢問醫師或藥師。

三、如何服用本藥品：

請遵照醫師指示的用法，藥量及時間服用。

四、若忘記服藥該怎麼辦？

馬上服用忘記的劑量，但是如果太接近下次劑量時間，就不要補服忘記的劑量，照正常服藥的時間服用即可，不可一次服兩倍的劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
暈眩、頭昏眼花、視覺改變(視力模糊、黃色視覺)、皮疹、心搏動不規則	若症狀嚴重且持續未改善，請告知醫師
胃不適、嘔吐、腹瀉、食慾不振、手腳水腫、體重不正常增加、呼吸困難	請立即就診

六、注意事項：

- (1)在服用毛地黃(digoxin)前，應告訴醫師過去之病史及藥品過敏史，尤其是曾對毛地黃過敏者。
- (2)請告訴醫師及藥師你目前正使用之藥品(包括處方藥及成藥)，尤其是制酸劑(俗稱胃藥)，抗生素，鈣片，類固醇，利尿劑，甲狀腺藥或其他心臟藥。
- (3)醫師會依你對毛地黃的反應，調整劑量，請記得按時回診。
- (4)孕婦，計劃懷孕或授乳婦女請於開始服藥前告知醫師。
- (5)若於服藥期間懷孕，請立刻告知醫師。
- (6)請在手術前(包括拔牙)，讓醫師知道你正在服用毛地黃。
- (7)沒有醫師指示，請勿自行停藥。
- (8)毛地黃可能讓你感覺昏昏欲睡，除非你已確定毛地黃對你的影響，否則請避免從事容易引起傷害的危險性活動，如開車，操作機械。
- (9)酒精會加重毛地黃引起之昏昏欲睡的感覺。
- (10)旅行前請確定身邊有足夠的藥量。
- (11)請勿讓他人服用你的藥品。

七、藥品該如何存放？

儲存於 15~25 度之乾燥環境下，避免放置孩童可以取得的場所。

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)