

**Brilinta 用藥指導衛教單**

編號：C134

**一、您目前所服用之藥品：**

中文名	英文名	成分名	劑量(每錠)
百無凝	Brilinta	Ticagrelor	90mg

**二、作用：**

抑制血小板凝集，降低急性冠心症病人發生栓塞性心血管事件(如：中風、心肌梗塞)。

**三、如何服用本藥品：**

用法及劑量遵照醫師處方使用。可與食物同時或分開服用。

**四、若忘記服藥該怎麼辦？**

如果忘記服藥，想起來請盡快補吃；但是，如果已經接近下次服藥時間，則不補服，等到下次服藥時間再服藥，不可一次服用二倍劑量。

**五、可能產生的副作用及處理方式：**

症狀	如何處理
頭痛、咳嗽、頭暈、背痛、腹瀉	若症狀嚴重或未改善，請於回診時告知醫師
持續血便或黑便、嚴重胃痛、不尋常的瘀青、出血或流鼻血、血尿、心律不整、不尋常的呼吸困難	請立即就醫

**六、注意事項：**

- (1)服用本藥前，若您懷孕、哺乳、曾有藥物過敏、其他疾病(如肝病、顱內出血、消化性潰瘍)或同時服用其他藥物，如非固醇類抗炎止痛劑、抗凝血劑(如 warfarin)，抗癲癇藥(如 carbamazepine、phenytoin、phenobarbital…)，抗微生物製劑(如 rifampin、ketoconazole、clarithromycin…)，抗憂鬱劑，毛地黃或降血脂藥(如 simvastatin、lovastatin)，請先告知醫師。
- (2)進行任何手術前，請主動告知醫師或牙醫師目前正服用本藥。
- (3)本藥有可能會引起出血問題，請避免從事激烈運動或其餘容易導致瘀血受傷的活動。
- (4)未經醫師許可，請不要自行服用任何藥品或保健食品，尤其是非類固醇性消炎止痛藥、抗凝血劑、血小板凝集抑制劑、金絲桃草 (St. John' wort) …等，以避免影響藥效。
- (5)突然停藥可能會導致病情惡化，未經醫師許可請勿擅自停藥。
- (6)服藥期間發生不尋常出血、胸悶、喘鳴或呼吸困難，請立即就醫。
- (7)為確保治療效果請定期回診，並確定身邊有足夠的藥量。

**七、藥品該如何存放？**

儲存於 15~25 度之乾燥環境下並將藥品存放在小孩不易取得的地方

**本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師**

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)