

PLAVIX 用藥指導衛教單

編號：C135

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每錠)
保栓通	PLAVIX	Clopidogrel	75mg/tab

二、作用：

本藥屬於血小板凝集抑制劑，可幫助降低中風、心肌梗塞及其他由粥狀動脈硬化所引起的疾病的發生率。

三、如何服用本藥品：

用法及劑量遵照醫師處方使用。可與食物同時或分開服用。

四、若忘記服藥該怎麼辦？

如果忘記服藥，想起來請盡快補吃；但是，如果已經接近下次服藥時間，則不補服，等到下次服藥時間再服藥，不可一次服用二倍劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
血便或黑便、嚴重胃痛、不尋常的瘀血或出血或流鼻血、血尿、發燒、寒顫、喉痛	請立即就醫
消化不良、胃不適、便秘、腹瀉、輕度發疹	請告知醫師

六、注意事項：

- (1) 服用本藥前，若您懷孕、哺乳、曾有藥物過敏、其他疾病（如肝病、出血性潰瘍等）或同時服用其他藥物，如非固醇類抗炎止痛劑、抗凝血劑（如：warfarin、heparin），抗癲癇藥（如 phenytoin）、化學治療劑（如：tamoxifen）、tolbutamide、torsemide 或降血脂藥（fluvastatin），請先告知醫師，由醫師決定是否應用藥。
- (2) 在進行任何手術前，您應告知醫師或牙醫師目前正服用本藥。
- (3) 本藥有可能會引發出血問題，若正從事激烈運動而易導致受傷，應事先告知醫師。

七、藥品該如何存放？

儲存於 15~25 度之乾燥環境下並將藥品存放在小孩不易取得的地方

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)