

新型抗凝血劑 用藥指導衛教單

編號：C136

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每錠)
拜瑞妥	Xarelto	Rivaroxaban	10mg/tab
拜瑞妥	Xarelto	Rivaroxaban	15mg/tab
普栓達	Pradaxa	Dabigatran	110mg/cap
艾必克凝	Eliquis	Apixaban	5mg/tab

二、作用：

預防中風及全身性栓塞。

三、如何服用本藥品：

請遵照醫師指示的用法服用。

四、若忘記服藥該怎麼辦？

●若您每天服藥一次：

如果忘記服藥，當天想起來請立即服用當日劑量；不可一次服用兩倍劑量。

●若您每天服藥兩次：

如果忘記服藥可於想到時立即服用，並確認當日劑量都已服用完畢；次日再遵照每日兩次的服藥方式。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
出血現象（例如：血尿、血便或黑便、不尋常的嚴重流鼻血或牙齦出血、皮膚瘀青、咳血、嘔吐出血或經血過多），嚴重頭痛、頭暈或全身無力，不明原因的傷口紅腫、疼痛，過敏反應（皮膚癢、紅疹、臉部、手、嘴唇或喉嚨腫、胸悶、呼吸困難），皮膚起泡、脫皮，黃疸	請立即就醫
腹痛、噁心、嘔吐、便秘、腹瀉、發燒、食慾變差、虛弱、倦怠、關節或肌肉疼痛、皮膚紅疹	若症狀較嚴重或持續發生，請立刻告訴醫師

六、注意事項：

- (1)服用藥物之前，應主動告知醫生過去病史，尤其是凝血方面的疾病、腦中風、肝臟或腎臟疾病、胃腸潰瘍或出血以及最近是否有接受腦部、脊髓或眼科手術…等。
- (2)若您計畫懷孕或正在哺乳，請於服藥前主動告知醫師。若於服藥期間發現懷孕，請立刻告訴醫生。
- (3)請讓所有照顧您的醫師及牙醫師知道您正在服用**抗凝血藥劑**。尤其是在進行手術、拔牙或侵入性檢查前，請主動告訴醫師您正在服用**抗凝血劑**。
- (4)未經醫師許可，請不要自行服用任何藥品或保健食品，尤其是阿斯匹林、非類固

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)

醇性消炎止痛藥、抗凝血劑、血小板凝集抑制劑、金絲桃草（St.John's wort）等，以避免影響藥效。

- (5)避免割傷自己，請小心刷牙及刮鬍鬚，盡量使用軟毛牙刷及電動刮鬍刀。
- (6)避免用力挖鼻孔，可能導致嚴重流鼻血。
- (7)避免從事容易引起挫傷、扭傷的危險性活動（例如：撞擊性的運動）。
- (8) 若發生不尋常的出血或瘀青，請立即就醫。
- (9) 請確定身邊有足夠的藥量。請勿在未告知醫師情況下自行停藥。

七、藥品該如何存放？

儲存於 15~25 度之乾燥環境下並將藥品存放在小孩不易取得的地方

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)