

高血壓複方用藥指導衛教單

編號：F125

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每錠)
可普諾維	CoAprovel	Irbesartan+Hydrochlorothiazide	150mg/12.5mg
好你悅	Hyzaar	Losartan+Hydrochlorothiazide	100mg/12.5mg
複必康平	Micardis plus	Telmisartan+Hydrochlorothiazide	40mg/12.5mg

二、作用：

治療高血壓。

三、如何服用本藥品：

請遵照藥袋上的用法服用，勿自行停藥。

四、若忘記服藥該怎麼辦？

如果忘記服藥，想起時儘快服用。如果想起時幾乎接近下次服藥時間，則不補服，依照原來時間服用下一次的劑量即可，不可一次服用雙倍劑量

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
頭痛，頭昏，睡眠障礙，咳嗽，疲倦，鼻塞，腹瀉，腹部不適，肌肉痛或抽筋，關節痛	症狀嚴重時，請與告知醫師
呼吸困難、急促，臉部、舌頭或咽喉腫脹，蕁麻疹，虛弱無力，非預期性發燒、寒顫或喉痛、皮膚癢、皮疹、咽喉水腫、意識模糊、虛弱無力、昏厥、胸痛、肌肉抽筋、聽力喪失、嚴重腹痛、口乾、噁心、嘔吐、腹瀉、皮膚變黃、異常出血	請立即就醫

六、注意事項：

- (1)有下列情況時請先告知您的醫師：曾對磺胺類藥物過敏；有血液電解質不平衡或肝臟、腎臟、心臟功能不全、痛風、紅斑性狼瘡或聽力方面的疾病。
- (2)女性若已懷孕、準備懷孕或授乳期，應事先告訴醫師。
- (3)請先告知醫師目前正在服用的其他藥品（包括指示用藥與成藥），尤其是降壓藥、毛地黃、類固醇及非固醇類抗炎止痛劑；未經醫師許可請勿自行服用成藥、保健食品或中草藥。
- (4)突然停藥可能會導致病情惡化，未經醫師許可請勿擅自停藥。
- (5)必須按時回診，定期量血壓及作相關檢查，以確定您對此藥的反應。
- (6)服藥期間若發生嚴重口乾、噁心、嘔吐、腹瀉、肌肉抽筋或聽力喪失，請立即告知醫師。
- (7)可能引起頭暈，做危險性工作（如：開車、操作機械）時應小心。
- (8)避免飲用酒精性飲料，因為酒精可能會增加眩暈、昏倒的機會。
- (9)服藥期間若接受外科手術（包括牙科手術），請事先告知醫師您正在服用此藥。
- (10)請勿讓別人服用您的藥品。

七、藥品該如何存放？

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)

1. 儲存於 15~25 度之乾燥環境下並將藥品存放在小孩不易取得的地方
2. Micardis plus 藥錠易潮解，請於服藥時再剝出藥錠。

**本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師**

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)  
1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)