

SYNSEQ & VENINA 用藥指導衛教單

編號：K101

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每錠)
欣宜倩	SYNSEQ	Estradiol valerate+medroxyprogesterone Acetate	2mg/10mg
維妮娜	VENINA	Estradiol valerate+ medroxyprogesterone Acetate	1mg/2.5mg

二、作用：

- (1)補充或替代卵巢內生的動情素，減少婦女因動情素缺乏所產生的症狀或使之完全消失，亦可防止停經後婦女之骨質流失。
- (2)是一種三階段動情素及黃體素製劑，在每個循環療程中，加入 12 天黃體素，可保護子宮內膜，對大部份的病人可引起子宮內膜規律剝落。在每個循環療程的後期，加入低劑量動情素，可防止停經症狀再出現，且不會干擾停經後出血

三、如何服用本藥品：

(1)服用順序：

A.請依次由白色錠開始服用，再服用藍色錠，最後服用粉紅色錠。

B.每天口服一錠，持續使用無需間斷。建議每天於固定時間服用。

(2)若已停經或服用其它連續性荷爾蒙者，可於任何一天開始依指示服用。有月經的婦女或已開始荷爾蒙補充療法的婦女，第一錠應從月經出血第五天開始依指示服用。

(3)正常的似月經出血可能會出現，通常在服用低劑量動情激素期間，如 7 錠粉紅色錠劑時或可能在最後服用藍色錠劑期間出現。

四、若忘記服藥該怎麼辦？

如果在時間內忘記服藥，請於 12 小時之內補服，否則放棄未服的藥錠，至下一服藥時

間繼續服用當天藥錠。不可一次服用兩倍劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
不規則出血、乳房觸痛、噁心、頭痛與水腫、 皮疹、搔癢	若症狀嚴重或持續未改善，應 於回診時告知醫師
禿髮、多毛、下腹疼痛、腿痙攣	應儘快就醫

六、注意事項：

(1)在開始動情激素療法前，應先做身體檢查及完整醫療及家族病史的調查。特別是關於：血壓、乳房檢查、腹部及婦科檢查。

(2)現在或以前曾單獨使用動情激素治療的患者，在開始使用治療前，應先小心檢查子宮內膜是否有過度刺激的可能性。

七、藥品該如何存放？

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)

儲存於 15~25 度之乾燥環境下並將藥品存放在小孩不易取得的地方

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)