

**解熱、鎮痛用藥指導衛教單**

編號：P101

**一、您目前所服用之藥品：**

中文名	英文名	成分名	劑量
舒抑痛口服懸液	Ibuprofen(Idofen) syrup	Ibuprofen	20mg/ml,60ml/bot
非炎栓劑	VOREN Supp	Diclofenac	12.5mg/supp

**二、作用：**

解熱、鎮痛、緩解發炎反應所引起的症狀。

**三、如何服用本藥品：**

- (1)由於各個藥品作用時間長短不一，因此服藥間隔時間也不同。請切實遵照醫師處方服藥。
- (2)為了降低腸胃道的刺激，此類藥品應伴隨食物併服。
- (3)若栓劑太軟較不易給藥，可將栓劑（包裝不可拆除）置於冰箱或冷水中 30 分鐘後再使用。

**四、若忘記用藥該怎麼辦？**

- (1)一天一次或兩次：一或二個小時內若記得應儘速服藥；若忘記時間已久則不用補服，仍按原時間服藥，不可一次服用雙倍量。
- (2)一天服藥兩次以上：立即補服，若已接近下次服藥時間則不補服，仍按原時間服藥，不可一次服用雙倍量。

**五、可能產生的副作用及處理方式：**

症狀	如何處理
腹部不適、便秘、腹瀉、食慾變差、眼睛對光敏感度增加、睡眠不佳、體重減輕	若症狀持續請就醫
尿液變濁或排尿困難、喉嚨痛、頭痛、黃疸、急速體重增加、浮腫、眼皮腫	請儘速就醫
嚴重腹部或胃灼熱或絞痛、黑便、血尿、胸痛、癲癇、發燒、不尋常出血、吐血	請立即就醫 (過量或嚴重副作用)
嚴重暈眩、呼吸變快或不規則、心跳變快或不規則、蕁麻疹、臉部或喉頭腫脹、呼吸困難、胸悶	請立刻至急診就醫 (過敏反應)

**六、注意事項：**

- (1)舒抑痛(Ibuprofen syrup)藥品可能會增加心血管栓塞、中風或腸胃道出血的風險，病人如有心臟方面病史或腸胃道出血病史或長期服用本類藥物，應告知醫師。
- (2)使用本類藥品前或使用期間，醫師可能會處方監測血球計數、肝、腎功能，糞便潛血反應等檢驗，請確實依照醫師指示完成檢驗。
- (3)少數病人服用此類藥品可能會覺得眩暈或嗜睡。在未確定此藥對您有何影響之前，請勿開車或操作危險機械。
- (4)服藥期間應避免喝酒。

**本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師**

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)

(5)如有心臟相關病史、高血壓、水腫、氣喘、胃腸道出血、凝血功能異常或肝臟、腎臟疾病等病史，服用本藥前應告知醫師。

(6)計劃懷孕、懷孕或授乳，用藥前應告知醫師。懷孕後期應避免使用此類藥品，以免發生胎兒主動脈導管提早閉合。

## 七、藥品該如何存放？

1. 栓劑須冷藏或儲存於15~25度之乾燥環境下並將藥品存放在小孩不易取得的地方。
2. 藥水開封後保存期為一個月，若有剩餘藥水則依廢棄藥品處理方法丟棄。

**本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師**

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)