

肛門軟膏用藥指導衛教單

編號：Q111

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名/劑量(每 MG)
喜癒痔軟膏	XYLMOL oint	Lidocaine 60mg Al acetate 50mg ZnO 400mg Hydrocortisone 5mg

二、作用：

使用於痔瘡、肛門裂傷、肛門周圍炎。

三、如何服用本藥品：

1. 用法遵照醫師處方使用。有任何問題請教藥師或醫師。
2. 肛門用。排便後、沐浴後或睡前使用。
3. 軟膏：以少量塗於痛、癢處。可將所附軟管插在藥膏管口，再插入肛內，輕輕指壓及轉動藥膏後拿出，藥劑即可均勻塗抹於傷口。

四、若忘記服藥該怎麼辦？

- (1) 一天一次或兩次：一或二個小時內若記得應儘速服藥；若忘記時間已久則不用補服，仍按原時間服藥，不可一次服用雙倍量。
- (2) 一天服藥兩次以上：立即補服，若已接近下次服藥時間則不補服，仍按原時間服藥，不可一次服用雙倍量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
直腸刺激、灼熱感、癢或出血、皮膚疹、呼吸短促、蕁麻疹、視力模糊、痙攣、焦慮、心跳不規則	請停藥，並立即就醫

六、注意事項：

- (1) 劑量遵照醫師或藥師指示使用。不要任意增加用藥次數或用藥時間。
- (2) 有下列情況者請告知醫師：懷孕、哺乳或準備懷孕、曾有藥物過敏、或其他疾病（肺結核、糖尿病、皮膚病毒性感染）。若有懷疑任何因用藥而產生的不適，請告知醫師。
- (3) 藥膏因含類固醇，長期大量使用可能會造成下列現象：皮膚痊瘡、圓臉、不規律心跳、血壓上升、食慾不振、水份滯留、掉髮、肌肉痙攣或無力、月經不規則等等。

七、藥品該如何存放？

儲存於 15~25 度之乾燥環境下

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)