

吸入劑用藥指導衛教單

編號：Q311

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(puff)
昂舒	Onbrez Breezhaler	Indacaterol maleate 150 mcg	150 mcg
昂帝博	Ultibro Breezhaler	Indacaterol Maleate 110mcg + Glycopyrronium Bromide 50mg	110mcg/50mg

二、作用：

用於慢性阻塞性肺部疾病之維持治療

三、如何服用本藥品：

(1)成人建議劑量為一天一粒膠囊，昂舒/昂帝博膠囊只可使用昂舒/昂帝博專用吸入器經由口腔吸入給藥。

(2)昂舒/昂帝博膠囊僅可吸入使用，不可吞服且每日應依醫師囑咐時間使用。

(背面附操作圖片)

四、若忘記使用該怎麼辦？

想起時，立即使用，若已接近下次用藥時間，只需使用下一次劑量，不可一次使用雙倍劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
喉嚨輕微不適、咳嗽、聲音嘶啞、入睡困難、頭痛、不安、顫抖、暈眩、心悸、肌肉痙攣、精神不安、急躁、憂鬱	若嚴重且持續，請告知您的醫師
過敏反應(如：癢、蕁麻疹、臉或手水腫、呼吸困難等)，心跳很快或不規律，呼吸道症狀惡化	停藥並立即就醫

六、注意事項：

(1)昂舒/昂帝博即使沒有症狀也應常規使用，才能達到最佳治療效益。且必須定期接受醫師的評估，以維持最適當的劑量；並且只有在醫師的指示下才可改變使用劑量。

(2)有以下情況，使用本類藥品需告知您的醫師：曾對乙型交感神經興奮劑(如 Salmeterol)或其他類固醇有過敏反應者、氣喘控制情形變差時、心血管疾病、冠狀動脈功能不全、心律不整、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、低血鉀症、開放性或不活動性肺結核病人、懷孕或正在授乳。

(3)使用乙二型交感擬神經劑可能發生低血鉀症，對於嚴重氣喘者應特別謹慎，與黃嘌呤衍生物、類固醇、利尿劑合併治療時，低血鉀更有可能發生。此外，對心律不整患者，缺氧可能使低血鉀更嚴重，請配合醫師定期監測血鉀濃度。

七、藥品該如何存放？

(1)於30度以下，避光儲存。放置於兒童拿不到的地方。

(2)昂舒/昂帝博必須存放在鋁箔中，要使用時才取出。

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)

昂舒吸入膠囊使用方式

Onbrez Breezhaler Inhalation Powder User Manual

藥品成份：每顆膠囊含有 indacaterol 150µg

適應症：慢性阻塞性肺疾之維持治療

參考資料：昂舒藥品仿單




1 開



拔開帽蓋並完全打開吸入器

2 放



將膠囊從鋁箔片取出，放置於吸入器中央凹槽內

3 蓋




蓋上吸入器並聽到喀噠聲

4 壓



吸入器向上，將兩邊按鈕同時壓到底後放開，即可刺破膠囊

5 吸



將吸嘴含於兩唇之間，快速深深吸一口氣，接著閉氣 5-10 秒

6 丟



打開吸入器，倒出空膠囊並丟棄

特點

- 聽** 在你使用吸入器吸藥時，膠囊會震動，您會聽見呼呼的聲音
- 嚐** 藥品吸入後，您會感覺嘴巴裡有甜味
- 看** 膠囊本身為透明無色，可以清楚看到使用過的膠囊已無藥粉

NOVARTIS
台灣諾華股份有限公司

台北市仁愛路2段99號11樓 電話：(02)2341-6580
諾華健康諮詢中心：0800-880-870 傳真：(02)2343-2096
www.novartis.com.tw

衛署藥輸字第025282號
僅限醫療專業人士用以衛教確立診斷並處方本藥品之病患及其家屬

2296-PE-11-11

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)
1353(急診藥局)(24小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)