

吸入劑用藥指導衛教單

編號：Q321

一、您目前所服用之藥品：

中 文 名	英 文 名	成 分 名	劑量(puff)
備喘全	Berodual N	Ipratropium Br + Fenoterol HBr	20mcg/50mcg

二、作用：

- (1)吸入性皮質類固醇，用以控制肺部及呼吸道的發炎反應，以減輕氣喘之症狀及惡化。
- (2)短效型選擇性乙二型交感神經興奮劑，局部作用在肺部，鬆弛支氣管平滑肌而達支氣管擴張作用。

三、如何使用本藥品：

- (1)每天 2~4 次。每次 1~2 噴(每噴間隔最好 2 分鐘)。每天最大劑量 8 噴。遵照醫師指示劑量使用。
- (2)使用方法：1.移去護蓋。2.將吸入輔助器較粗一邊與噴霧劑含口器連接。3.上下搖動噴霧罐，同時確定上述連接處是否緊密。4.輕輕將空氣徐徐呼出(正常呼氣)。舌頭下壓，喉嚨放鬆。5.移去蓋子然後以食指用力壓一下噴霧劑的底部，並同時從輔助器之一端以正常速度吸入。6.閉氣至少五~十秒鐘 (背面附操作圖片)

四、若忘記用藥該怎麼辦？

想起時，立即使用，若已接近下次用藥時間，只需使用下一次劑量，不可一次使用雙倍劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
喉嚨輕微不適、咳嗽、聲音嘶啞、部分病人亦有咽喉部念珠菌感染的症狀、入睡困難、頭痛、不安、顫抖、暈眩、心悸、肌肉痙攣、精神不安、急躁、憂鬱	若嚴重且持續，請告知您的醫師
過敏反應(如：癢、蕁麻疹、臉或手水腫、口咽部水腫、呼吸困難等)，心跳很快或不規律，呼吸道症狀惡化	停藥並立即就醫

六、注意事項：

- (1)每次使用藥品後，請用清水漱口，然後吐掉(不可吞下)，減少口咽部長鵝口瘡。
- (2)備喘全(Berodual N)即使沒有症狀也應常規使用，才能達到最佳治療效益。且必須定期接受醫師的評估，以維持最適當的劑量；並且只有在醫師的指示下才可改變使用劑量。

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)


(3)有以下情況，使用本類藥品需告知您的醫師：曾對乙型交感神經興奮劑(如 Salmeterol)或其他類固醇有過敏反應者、氣喘控制情形變差時、心血管疾病、冠狀動脈功能不全、心律不整、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、低血鉀症、開放性或不活動性肺結核病人、懷孕或正在授乳。

(4)使用乙型交感神經興奮劑可能發生低血鉀症，對於嚴重氣喘者應特別謹慎，與黃嘌呤衍生物、類固醇、利尿劑合併治療時，低血鉀更有可能發生。此外，對心律不整患者，缺氧可能使低血鉀更嚴重，請配合醫師定期監測血鉀濃度。


七、藥品該如何存放？

於室溫下乾燥處，避光保存，避免放在孩童可以取得的場所；避免將瓶子放入火中焚化。


Evohaler/MDI 使用方法




將噴霧器出口蓋子移除(接上輔助器)
並上下振搖之。




吸入前先呼一口氣



將吸嘴含於兩唇間



按壓一次吸入器，同時慢慢持續深吸氣
至少3-5秒然後閉氣10秒，再慢慢吐氣



若需第二個劑量，請
隔1-2分鐘，再吸入。



蓋上護蓋。



※請利用『正』字紀錄使用次數，快用
完時可即時回診，以免藥量不夠。

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)