

吸入劑用藥指導衛教單

編號：Q341

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(puff)
使肺泰(兒童)	Seretide accuhaler100	Fluticasone+Salmeterol	100mcg/50mcg
使肺泰(成人)	Seretide accuhaler500	Fluticasone +Salmeterol	500mcg/50mcg

二、作用：

- (1)吸入性皮質類固醇，用以控制肺部及呼吸道的發炎反應，以減輕氣喘之症狀及惡化。
- (2)長效型選擇性乙二型交感神經興奮劑，局部作用在肺部，鬆弛支氣管平滑肌而達支氣管擴張作用。

三、如何使用本藥品：

- (1)用法用量因人而異，請依照醫師處方指示使用。
- (2)使用方法：(背面附操作圖示)

四、若忘記用藥該怎麼辦？

想起時，立即使用，若已接近下次用藥時間，只需使用下一次劑量，不可一次使用雙倍劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
喉嚨輕微不適、咳嗽、聲音嘶啞、部分病人亦有咽喉部念珠菌感染的症狀、入睡困難、頭痛、不安、顫抖、暈眩、心悸、肌肉痙攣、精神不安、急躁、憂鬱	若嚴重且持續，請告知您的醫師
過敏反應(如：癢、蕁麻疹、臉或手水腫、口咽部水腫、呼吸困難等)，心跳很快或不規律，呼吸道症狀惡化	停藥並立即就醫

六、注意事項：

- (1)每次使用藥品後，請用清水漱口，然後吐掉(不可吞下)，減少口咽部長鵝口
- (2)本類吸入劑無法快速緩解氣喘急性發作時之症狀，故在氣喘急性發作時不應使用本類藥物；此時應使用短效吸入型支氣管擴張劑(如泛得林 **Ventolin Inhaler** 或備喘全 **BeroDUAL N** 等)
- (3)若使用本類藥一、二週後，氣喘症狀仍沒有改善，或者更加惡化，千萬別擅自增加使用劑量，應立即回診告知您的醫師。
- (4)即使沒有症狀也應常規使用，才能達到最佳治療效益。且必須定期接受醫師的評估，以維持最適當的劑量；並且只有在醫師的指示下才可改變使用劑量。

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)

(5)有以下情況，使用本類藥品需告知您的醫師：曾對乙型交感神經興奮劑(如 Salmeterol)或其他類固醇有過敏反應者、氣喘控制情形變差時、心血管疾病、冠狀動脈功能不全、心律不整、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、低血鉀症、開放性或不活動性肺結核病人、懷孕或正在授乳。

七、藥品該如何存放？

請連同藥袋於室溫，乾燥處，避光保存，避免放在孩童可以取得的場所；避免將瓶子放入火中焚化。

如何正確使用 Accuhaler™

準納™ 乾粉吸入器



1 開

用一隻手將準納乾粉吸入器拿住，讓計量視窗對你，把另一隻手的大拇指放在拇指板上，向後推至盡頭卡住。

2 上藥

這時你會看到上藥板手，用大拇指將上藥板手向後扳到底，你會聽到「嗒」一聲，此時即有一次劑量可供使用。

3 吸

先向外吐一口氣（勿朝吸嘴吹氣），然後將吸嘴放入嘴內，快速地吸飽一口氣，然後將準納乾粉吸入器擱開嘴，並停止呼吸 10 秒鐘，再慢慢呼氣，即完成一次吸入劑量。

4 關閉

用大拇指向左推，關上準納乾粉吸入器，待下次使用。（不需扳回上藥板手）

計量視窗 上藥板手 吸嘴

第一次使用時，計量視窗上的數字顯示 00，每使用一次，數字依序遞減。若只剩 01、02，數字會變成紅色。

注意事項：
1. 吸嘴接觸人口以減少口腔念珠菌感染
2. 相關使用問題請向您的藥劑師

gsk GlaxoSmithKline

葛蘭素史克藥業(台灣)股份有限公司台灣分公司
本資料僅由醫護人員提供給使用本藥之患者
相關資料請參閱仿單

07-2008-SRT-06-C-0030

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)