

Spiriva Respimat 用藥指導衛教單

編號：Q361

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(puff)
適喘樂舒沛噴	Spiriva Respimat	Tiotropium	2.5mg/puff 60puffs/4ml
適倍樂舒沛噴	Spiolto Respimat	Tiotropium 2.5mcg + Olodaterol 2.5mcg	2.5mcg+2.5mcg/PUFF 60puffs/4ml

二、作用：

(1)用於治療慢性阻塞性疾病，包括慢性支氣管炎及肺氣腫之長期維持治療。

三、如何服用本藥品：

(1)用法用量因人而異，請依照醫師處方指示使用。

(2)使用方法：**(背面附操作圖示)**

四、若忘記服藥該怎麼辦？

想起時，立即服用，若以接近下次服藥時間，則只需服用下一次劑量，不可一次服用雙倍劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
便秘、心灼熱感、胃痛、胃不舒服、眼睛乾澀、輕微視力模糊、口乾、喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、咳嗽、或其他感冒症狀	應告知醫師
過敏反應： 如臉、手或腳癢、紅腫，口或喉嚨腫、刺痛感，胸悶胸痛、呼吸困難、短促、哮喘、血尿或濁尿、排尿量或頻率改變、排尿困難、眼睛痛、紅或視力模糊	立即通知醫師

六、注意事項：

(1)用藥後如果發生胸痛、心跳快速或不規則、呼吸急促、嚴重顫抖等，請立刻就醫。

(2)不適用於急性支氣管痙攣的治療。

(3)當懷孕或哺乳時，或有肝腎疾病、狹角性青光眼、攝護腺問題、排尿困難之病人，請先告知醫師。

七、藥品該如何存放？

請存放 30°C 以下。請勿冷凍。

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)

了解您的 適喘樂®舒沛噴®吸入器

使用說明

SPIRIVA® 適喘樂®
(tiotropium)
Respimat® 舒沛噴® Soft Mist® Inhaler

在第一次使用前，請務必執行步驟1至6

1



綠色蓋子(A)必須蓋緊，按壓住安全扣(E)並拔下透明底座(G)。

2



自藥盒取出藥罐(H)。將藥罐的窄端推向吸入器，直到發出“卡嗒”聲。放在堅固表面沿著吸入器輕推藥罐，以確保藥罐已裝入吸入器。藥罐一旦插入吸入器後，不可再取出。

3



裝回透明底座(G)。請勿再將透明底座取下。

4



將適喘樂®舒沛噴®吸入器朝上握好，綠色蓋子(A)蓋緊。將透明底座(G)依標籤上之紅色箭頭方向旋轉，直到聽到“卡嗒”聲(約轉半圈)。



5



打開綠色蓋子(A)。

6



將適喘樂®舒沛噴®吸入器朝向地面。按壓給藥按鈕(D)。蓋上綠色蓋子(A)。

重複 步驟4、5、6，直到出現霧狀的藥液。再重複步驟4、5、6三次，以確保吸入器已備妥可供使用。

現在您的適喘樂®舒沛噴®吸入器已可以使用

[這些步驟不會影響可供使用的劑量數。在備妥適喘樂®舒沛噴®吸入器後，本藥可提供30個劑量(噴60次)。] 若您的適喘樂®舒沛噴®吸入器已超過7天未使用，先向地面噴一次。若已超過21天未使用，先重複步驟4、5、6，直到出現霧狀的藥液。然後再重複步驟4、5、6三次。

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)