

Ellipta 用藥指導衛教單	編號：Q371
------------------------	----------------

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(puff)
安肺樂易利達	Anoro Ellipta	Umeclidinium+Vilanterol	55mcg+22mcg 30puff
潤娃易利達	Relvar Ellipta	Vilanterol+ Fluticasone	92mcg+22mcg 30puff

二、作用：

用於以長期每日使用一次的方式做為慢性阻塞性肺病 (COPD)患者之氣道阻塞症狀的維持治療用藥。

三、如何服用本藥品：

- (1)每天吸入一次的方式投藥，且僅可經口吸入。
- (2)應每天於相同時間投藥。每 24 小時不可使用超過 1 次。

(2)使用方法：(背面附操作圖示)

四、若忘記服藥該怎麼辦？

想起時，立即服用，若以接近下次服藥時間，則只需服用下一次劑量，不可一次服用雙倍劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
便秘、心灼熱感、胃痛、胃不舒服、口乾、喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、咳嗽、或其他感冒症狀	應告知醫師
過敏反應： 如臉、手或腳癢、紅腫，口或喉嚨腫、刺痛感。 胸悶胸痛、呼吸困難、短促、哮喘、血尿濁尿、排尿量或頻率改變、排尿困難、眼睛痛、紅或視力模糊、心搏速率、收縮壓或舒張壓升高	立即通知醫師

六、注意事項：

- (1)用藥後如果發生胸痛、心跳快速或不規則、呼吸急促、嚴重顫抖等，請立刻就醫。
- (2)不適用於緩解急性症狀。
- (3)乳蛋白過敏問題的患者不可使用
- (4)當懷孕或哺乳時，或有肝腎疾病、狹角性青光眼、攝護腺問題、排尿困難之病人，請先告知醫師。

七、藥品該如何存放？

請存放 30°C 以下。請勿冷凍。

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)

1 打開



準備用藥時，請推開蓋子，藥瓶會自動準備一劑的份量，您會聽到「喀嚓」一聲，劑量表也會減少一格。此時表示可以準備吸藥了。

2 吸入



吸入器先不要靠近嘴邊，在適當範圍內先儘量吐氣。

雙唇確實含著吸嘴，不要有空隙。此時長而穩定地深吸一口氣後，取出吸入器，閉氣約3-4秒，慢慢吐氣。

此藥品無明顯味道，只要正確使用吸入器，不需要擔心沒有吸入藥物。

3 關上



隨後，只要將蓋子蓋上，便完成了用藥。

就是這麼簡單！

或可以先用乾的面紙擦拭吸嘴，再蓋上蓋子。吸入器請放在安全的地方，方便隔天再使用。

(摘錄自廠商衛教單張)

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)