

TARIVID 耳滴劑用藥指導衛教單

編號：Q401

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每 ML)
泰利必妥點耳液	TARIVID	Ofloxacin	3mg/ml, 5ml/bot

二、作用：

為奎諾酮 (quinolones) 類抗生素，可治療細菌性耳部感染疾病。

三、如何使用本藥品：

(1)請遵照醫師處方指示使用，勿自行改變劑量、用法或自行停藥。本藥通常每天使用 1~2 次，每次 5 至 10 滴。

(2)用法：

A.原包裝為了維持封口完整，塑膠瓶蓋均為輕輕蓋上，呈現未開封狀態。第一次使用時請先旋緊瓶蓋，以瓶蓋內部的尖端刺穿瓶口後再開始使用。

B.將手徹底洗淨，用手握住耳用滴瓶數分鐘，使溫度接近體溫。側躺，患耳朝上，打開瓶蓋，擠壓滴瓶使藥液流入耳道內，將患耳往後上方拉，可促使藥液往內流，保持相同姿勢約 10 分鐘。

四、若忘記用藥該怎麼辦？

如果忘記點藥應儘快補上，然後照原來的劑量間隔點藥。若接近下一次點藥時才想起上一劑忘記點藥，則跳過該次劑量，而按正常劑量與間隔點藥，勿多補一個劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
輕微耳痛、耳部紅腫、耳朵癢、暈眩、嘴內有苦味、頭痛	密切觀察若症狀持續且嚴重時，請告知醫師
嚴重耳痛、皮疹、皮膚癢、呼吸困難、嘴或喉嚨腫脹、胸悶、肌肉或關節痛	請立即就醫

六、注意事項：

- (1)已知對本藥之任何成份過敏或曾對奎諾酮 (quinolones)類藥物過敏者須告知醫師。
- (2)泰利必妥點耳液(TARIVID)為抗生素有其治療療程，勿因臨床症狀改善即自行停藥，務必完成整個療程，以免產生抗藥性菌種。
- (3)使用數天後若臨床症狀無改善，請立即就醫。
- (4)懷孕、授乳或有其它疾病應於用藥前告知醫師。
- (5)點耳時若藥液的溫度過低可能會引起暈眩，使用時用手握住耳用滴瓶數分鐘，使溫度接近體溫時再使用。
- (6)用藥期間請保持患耳乾淨及乾燥，請勿游泳。
- (7)耳膜有破損的病人應謹慎使用，以免發生耳毒性。

七、藥品該如何存放？

儲存於 15~25 度之乾燥環境下並將藥品存放在小孩不易取得的地方

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)