

MYCOMB 耳滴劑用藥指導衛教單

編號：Q402

一、您目前所服用之藥品：

| 中文名 | 英文名 | 成分名 | 劑量(每 ML) |
|--------|--------|-----------------------------------|-------------------|
| 美康耳用滴劑 | MYCOMB | Triamcinolone +Nystatin +Neomycin | 1mg/10 萬 IU/2.5mg |

二、作用：

治療耳部及其周圍皮膚的細菌或黴菌感染。本藥所含成份 Neomycin 為胺基糖苷類抗生素對大部份革蘭氏陰性菌有殺菌作用，Nystatin 為多烯類抗黴菌藥物可治療黴菌感染，Triamcinoloneacetone 為類固醇具有消炎、止癢和抗過敏作用。

三、如何使用本藥品：

請遵照醫師處方指示使用，勿自行改變劑量、用法或自行停藥。本藥通常一天使用 3~4 次，每次 2~3 滴，滴入耳道，或以棉球沾之塞於耳道內使用。

四、若忘記用藥該怎麼辦？

如果忘記點藥應儘快補上，然後照原來的劑量間隔點藥。若接近下一次點藥時才想起上一劑忘記點藥，則跳過該次劑量，而按正常劑量與間隔點藥，勿多補一個劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

| 症狀 | 如何處理 |
|---------------------------|---------------------|
| 輕微的耳痛、耳部紅腫、頭痛、暈眩、嘴內有苦味 | 密切觀察若症狀持續且嚴重時，請告知醫師 |
| 嚴重的耳痛、皮疹、聽力異常、呼吸困難、嘴或喉嚨腫脹 | 請立即就醫 |

六、注意事項：

- (1) 已知對本藥之任何成份過敏者須告知醫師。
- (2) 本藥有其治療療程，勿因臨床症狀改善即自行停藥，務必完成整個療程。若臨床症狀無改善，請立即就醫。
- (3) 耳膜有破損的病人應謹慎使用，以免發生耳毒性。
- (4) 本藥含類固醇成份，若使用數天後臨床症狀無改善，請立即就醫，須顧慮可能由於類固醇的遮蔽作用而忽略了潛伏性的感染。
- (5) 懷孕、授乳或有其它疾病應於用藥前告知醫師。
- (6) 點耳時若藥液的溫度過低可能會引起暈眩，使用時用手握住耳用滴瓶數分鐘，使溫度接近體溫時再使用。
- (7) 用藥期間請保持患耳乾淨及乾燥，請勿游泳。

七、藥品該如何存放？

儲存於 15~25 度之乾燥環境下並將藥品存放在小孩不易取得的地方

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)