

陰道栓劑用藥指導衛教單

編號：Q521

一、您目前所使用之藥品：

中文名	英文名	成分名/劑量(每錠)
安可治陰道栓劑	ALBOTHYL V.T	Metacresolsulfonic acid and formaldehyde 90mg
克黴樂陰道錠	CLOMAZOLE	Clotrimazole 100mg/tab
洛黴欣陰道軟膠囊	Lomexin	Fenticonazole Nitrate 200mg

二、作用：

(1) 抗滴蟲劑及抗念珠菌劑(女陰與陰道炎、陰道炎、月經感染)

三、如何使用本藥品：

◎陰道用，打開外包裝之塑膠袋或鋁箔後，將栓劑或錠劑放入陰道深處(約兩個食指指節深)。用藥前後應洗淨雙手。最好睡前使用。

四、若忘記使用該怎麼辦？

- (1)一天一次或兩次：一或二個小時內若記得應儘速服藥；若忘記時間已久則不用補服，仍按原時間服藥，不可一次服用雙倍量。
- (2)一天服藥兩次以上：立即補服，若已接近下次服藥時間則不補服，仍按原時間服藥，不可一次服用雙倍量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
發燒、發疹、蕁麻疹、陰道有惡臭分泌物或腹痛	停藥，並立即就醫
陰道癢、刺痛、灼熱感、頭痛、腹部不舒服	若症狀持續或嚴重。請告知醫師

六、注意事項：

1. 勿使用超過建議劑量。
2. 使用本藥前有下列事項請告知醫師：懷孕、準備懷孕或哺乳、曾有藥物過敏。讓醫師決定是否應用藥。
2. 治療期間即使感染症狀消失，不可擅自停藥，仍需繼續使用，完成整個療程才能根治。否則可能會復發。
3. 月經期中仍可繼續治療，不必中斷。使用生理護墊，不要使用棉條。但詳情請依醫師指示。
4. 治療期間應注意個人衛生，以中性或鹼性肥皂清洗，避免陰道灌洗，因其可能將藥物沖出而降低療效。
5. 藥物可能與保險套發生作用，所以可能須採用其他的避孕方法。
6. 應穿棉製內褲，有助於治療與避免再感染。不要使用合成衣料(如尼龍)。

七、藥品該如何存放？

儲存於 15~25 度之乾燥環境下

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)