

安泰醫療社團法人安泰醫院 藥劑科衛教單張

ALLOPURINOL 用藥指導衛教單

編號：S101

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每錠)
安樂普諾錠	ALLOPURINOL	Allopurinol	100mg/tab

二、作用：

治療痛風，高尿酸症，尿石症(氧化鈣結石，尿酸鈣結石)。

三、如何服用本藥品：

- (1)請遵照醫師指示服用。
- (2)飯後服用可減少胃腸方面副作用，如腹瀉，噁心，嘔吐，脹氣等。

四、若忘記服藥該怎麼辦？

想起時儘快服用，若已接近下次服藥時間就不用補服，按原來時間服用下一次劑量，千萬不可一次服用兩倍的劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
胃痛、噁心、嘔吐、腹瀉、頭暈、消化不良、不尋常地掉頭髮	若症狀持續時、請告知醫師
指甲鬆動、手或腳麻木、痛或無力感、下背痛、鼻子不明出血	請儘速就醫
皮膚有小紅點、出疹、發癢、灼熱感、脫皮、增厚；排尿困難或疼痛；血便或血尿；黑便、便滯留；口腔或嘴唇流血性疼痛或潰瘍；肌肉疼痛，噁心或嘔吐(特別於皮疹之後)；眼睛紅或刺激感；呼吸會喘或困難，胸悶；口腔潰瘍；喉痛和發燒；尿量突然減少；上腹脹；臉、手指、腳腫大；腺體腫大或疼痛；不尋常流血，疲憊感或虛弱；體重突然增加；黃疸。	請停藥、並立即就醫

六、注意事項：

- (1)定時回診抽血檢查(尿酸值，肝功能，腎功能，全血球數，凝血時間)，以確定藥效及避免副作用的發生。
- (2)懷孕或哺乳者請先告知醫師，服藥期間懷孕者也請告知醫師。
- (3)請先告知醫師目前正在服用的其他藥品(包括指示用藥與成藥)，尤其是抗凝血劑，抗生素(ampicillin, Co-trimoxazole)，抗癌藥(azathioprine, mercaptopurine, cyclophosphamide)，高血壓藥，theophylline 或維他命。
- (4)曾對此藥過敏或有鬱血性心臟病、糖尿病、高血壓、癲癇、肝病、癌症

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)

或腎臟病等病史者，請先告知醫師。

- (5)為預防結石的產生，請每天喝十至十二杯的水，使尿液鹼化。
- (6)此藥無法緩解疼痛，開始服用此藥六至十二個月時，急性痛風可能仍會持續一段時間。然而隨著藥物定期使用，痛風發生率隨之降低或停止。
- (7)避免喝大量的酒影響藥效；服用此藥時，吃太多的維他命 C 可能易導致腎結石，故請先告知醫師。
- (8)此藥可能會讓你覺得睏倦,在未確定它對你有何影響之前，請勿開車或操作危險機械。
- (9)有極少數患者會引起嚴重過敏反應，例如 **Stevens-Johnson** 症候群，嚴重時甚至危及生命或致死。若發生嚴重皮膚症狀時應立即停藥，並尋求其他治療方式。

七、藥品該如何存放？

應於 15~25 度乾燥下儲存，避免放置孩童可以取得的場所。

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)