

安泰醫療社團法人安泰醫院 藥劑科衛教單張

DILANTIN 用藥指導衛教單	編號：S102
-------------------------	----------------

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每錠)
癲能停	Phenytoin	DILANTIN	100mg/cap

二、作用：

(1)控制癲癇或痙攣。(2)治療神經病變引起的疼痛。

三、如何服用本藥品：

- (1)請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或服藥時間。
- (2)非經醫師指示請勿擅自停藥，突然停藥會引起癲癇發作。
- (3)經管灌使用 phenytoin 者，請與管灌餵食時間前後隔開至少兩小時以上，以免影響藥品吸收。

四、若忘記服藥該怎麼辦？

想起時儘快服用，若已接近下次服藥時間就不用補服，按原來時間服用下一次劑量，千萬不可一次服用兩倍的劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
貧血、骨質疏鬆（長期使用）	在醫師指示下補充葉酸、維他命 D 及鈣片
毛髮增生	可使用脫毛劑
牙齦紅、腫、刺激感、出血	刷牙、按摩牙齦、用牙線、每半年進行口腔檢查，若症狀嚴重時請告知醫師
睏倦、頭暈、動作不協調、視線模糊或複視、失眠、緊張、頭痛	若症狀持續或嚴重時，請告知醫師
頻率增加、憂鬱或自殺意念 請立即就醫 噁心、嘔吐、便秘、胃痛、味覺喪失、沒胃口	隨餐服用或飲用大量水分，若症狀嚴重或持續時，請告知醫師
極度疲倦或頭暈、意識不清、言語不清、眼球震顫、紅疹、容易瘀血、不正常出血、皮膚及眼睛變黃、尿液顏色變深、淋巴結腫大、發燒、喉嚨痛、皮膚疹、皮膚起泡或脫皮，口腔、喉嚨腫脹或刺痛、胸悶及呼吸困難、癲癇繼續發作或頻率增加、憂鬱或自殺意念	請立即就醫

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)

六、注意事項：

- (1) 如果有發燒、呼吸、吞嚥困難、皮膚癢、臉、眼睛、嘴唇、舌頭紅腫、類似肝炎症狀如黃疸（皮膚和眼睛變黃），請立即就醫。
- (2) Phenytoin 可能會讓您覺得頭暈、動作不協調、視線模糊、複視、睏倦，對駕車、操作重機械或其他危險活動可能會造成影響，宜盡量避免。從事具潛在危險之活動（如開車、騎機車/腳踏車、游泳等）應有人陪同。
- (3) 不要喝含酒精性的飲料；非經醫師同意，請勿自行服用任何藥品、保健食品、中草藥及維他命製劑。
- (4) 請按時回診，配合抽血檢驗藥品血中濃度，並確定手邊隨時有足夠的藥量。
- (5) 孩童服用 phenytoin 時，請觀察並記錄其行為、情緒、注意力、手眼協調、解決問題及思考能力、癲癇發作情形。
- (6) 懷孕、計畫懷孕、哺乳，有肝病、腎臟病、淋巴結疾病、骨質疏鬆、糖尿病，正在服用其他藥品或曾對藥品有不良反應者（特別是抗癲癇藥），請事先告知醫師。
- (7) Phenytoin 可能降低避孕藥的效果，請採用其他避孕方式。若發現異常的陰道出血或分泌物，請立即告知醫師。
- (8) 進行手術（包含牙科手術）或侵入性處置前，請事先告知醫師或牙醫師您正在使用本藥品。

七、藥品該如何存放？

應於 15~25 度乾燥下儲存，避免放置孩童可以取得的場所。

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)