

安泰醫療社團法人安泰醫院 藥劑科衛教單張

結石清 K-Citrate 用藥指導衛教單

編號：X113

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每包)
結石清	K-Citrate	Potassium citrate	5gm/包

二、作用：

鈣石症引起之腎小管酸中毒，任何病理所引起的低檸檬酸尿草酸鈣腎石症和尿酸結石（有或無鈣結石）。

三、如何服用本藥品：

每包至少用 240 毫升冷開水或果汁混合，充分混合後請立即喝下，如太稠，可再加適量液體，喝完後，建議可以再加喝一杯冷開水。常用劑量一般是成人一天服用一至三次、每次半包至一包，於飯前或飯後服用，如果一天服用一次時，最好能安排於早晨服藥。或請遵照醫師處方服用。兒童請遵醫囑使用。

四、若忘記服藥該怎麼辦？

- (1)於正常服藥時間的兩小時內想起，請趕快服用。
- (2)若接近下次服藥時間才想起則跳過，不可一次服用兩倍劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
軟便、輕微胃痛、心或嘔吐	請告知醫師
黑便、思緒混亂、抽搐、嚴重腹瀉、嚴重心或有嘔吐、嚴重胃痛、呼吸困難	請立即告知醫師

六、注意事項：

- (1)服用本藥期間建議多喝水；不過，仍須以醫師交代的狀況為主。
- (2)請不要擅自併服制酸劑，若需服用請事先與醫師討論。
- (3)如果您正在服用利尿劑、毛地黃、止痛藥，使用本劑前請確認醫師知道您同時服用該等藥品。
- (4)如果出現肌肉無力、噁心、心律不整的現象，請通知醫師。

七、藥品該如何存放？

儲存於 30 度以下之乾燥環境下並將藥品存放在兒童不易取得的地方

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)
1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)