

安泰醫療社團法人安泰醫院 藥劑科衛教單張

愛克痰 ACTEIN 用藥指導衛教單

編號：X121

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每錠)
愛克痰發泡錠	ACTEIN	Acetylcysteine	600MG/tab

二、作用：

可促進呼吸道內黏稠分泌物的排除。

三、如何服用本藥品：

(1)用法用量因人而異，請依照醫師處方指示使用。

(2)請將愛克痰發泡錠放在杯子內用少許水(約 60~100cc)溶解後再服用。

四、若忘記服藥該怎麼辦？

如果及時想起請馬上服用，若想起時已接近下一次服藥時間則不用補服，按原來時間用藥，不可一次服用兩倍量並請告知醫師。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
氣喘、呼吸機能不全之病人可能會引起呼吸困難或發疹等過敏現象	中止投予，立即就醫
可能有輕微之臭氣、噁心、嘔吐、食慾不振	若持續嚴重，請告知醫師
疲勞、口乾、流鼻水、便秘、排尿困難、接觸性皮膚炎(均很少見)	若情況嚴重，請告知醫師

六、注意事項：

愛克痰發泡錠含有矯味劑阿斯巴甜，故苯酮尿症病人不宜使用。

七、藥品該如何存放？

儲存於 30 度以下之乾燥環境下並將藥品存放在兒童不易取得的地方

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)