

安泰醫療社團法人安泰醫院 藥劑科衛教單張

Champix 用藥指導衛教單

編號：X1215

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每錠)
戒必適 0.5mg	Champix	Varenicline	0.5mg/tab
戒必適 1mg	Champix	Varenicline	1mg/tab

二、 用：

戒菸輔助劑。

三、如何服用本藥品：

- (1)通常設定一個停止吸菸之戒菸日期，在這個日期前一週開始以本藥品治療。
- (2)本藥應在飯後服用，並以一整杯水配服。
- (3)本藥品治療期間可能需要調整劑量，請確實遵照醫囑服藥，勿自行增加或減少藥量。

四、若忘記服藥該怎麼辦？

想起時儘快補服，若已接近下次服藥時間就不用補服，按原來時間服用下一次的劑量，不可一次服用兩倍的劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
輕微皮膚癢、背痛、肌肉酸痛或抽筋、噁心、嘔吐、牙齦腫脹、食慾改變、頭痛、便秘、脹氣及睡眠障礙等	症狀持續，則應告知醫師
過敏反應（起水疱或起疹、臉或手腫、口腔或舌頭腫脹）、胸痛、呼吸困難、發燒或冷顫、不正常出血、血便或黑便、自殺意念或不正常的行為等	停止服藥，立即就醫

六、注意事項：

- (1)接受戒煙治療前，若有任何精神疾病史應告知醫師。
- (2)戒必適(Champix)不建議使用於 18 歲以下的病人。
- (3)服用本藥品可能會讓您覺得困倦，在未確定本藥品對您有何影響之前，請避免駕車、操作重機械及從事任何可能因警覺性降低導致危險的活動。
- (4)若您有腎臟疾病或憂鬱症或其他精神心理疾病，請先告知醫師。
- (5)因為該藥品可能會增加心血管疾病病人發生心血管不良事件的風險，若您患有心

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)

作

血管疾病，請先告知醫師。

(6)懷孕、計畫懷孕、哺乳者，正在服用其他藥品或曾有藥品不良反應者，請先告知醫師。

(7)服用後可能會有情緒低落、躁動、行為改變，甚至有自殺念頭等情形發生，若發生該等情形，應停止服用並盡速洽詢醫師。

(8)根據本藥品上市通報案例中，曾發生過極罕見但嚴重之皮膚反應，若您發生皮膚起疹伴隨粘膜損傷，或其他反應如起水疱、脫皮、皮膚發紅潰瘍或疼痛等徵狀出現時，請停藥並立即就醫。

七、藥品該如何存放？

儲存於 30 度以下之乾燥環境下並將藥品存放在兒童不易取得的地方

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)