

安泰醫療社團法人安泰醫院 藥劑科衛教單張

| 硝酸甘油 Nitroglycerin 用藥指導衛教單 | | | 編號：X123 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|
| 一、您目前所服用之藥品： | | | |
| 中文名 | 英文名 | 成分名 | 劑量(每錠) |
| 耐絞寧 | NTG | Nitroglycerin | 0.6mg/tab |
| 二、作用： | | | |
| 硝酸甘油可改善心臟的血氧供應量，可用於預防或緩解胸痛（心絞痛）。 舌下錠作用時間快，用於解除心絞痛的急性症狀。 | | | |
| 三、如何服用本藥品： | | | |
| 舌下錠—胸痛發作時含一粒於舌下，不可嚼碎或整粒吞服，讓藥錠於舌下慢慢溶化，通常有灼熱感，含藥時應坐下，以免血壓下降而發生暈眩。 藥效約兩分鐘出現，若舌下含藥五分鐘後，胸痛沒有改善或持續惡化，顯示病情緊急，必須儘快送醫（建議打 119 叫救護車）；在抵達醫院前，可每五分鐘含一粒舌下錠，總服用顆數不可超過三粒。 | | | |
| 四、若忘記服藥該怎麼辦？ | | | |
| 舌下錠—通常是急性發作時使用。 | | | |
| 五、可能產生的副作用及處理方式： | | | |
| 症狀 | 如何處理 | | |
| 頭痛 | 立刻躺下或坐下。若持續頭痛，請立即就醫 | | |
| 胃不舒服、眼花、口乾、皮疹 | 若症狀持續且嚴重時，請立即就醫 | | |
| 眩暈、虛弱、昏倒、心跳快速 | 立刻躺下或坐下。若症狀持續或昏倒，請立即就醫 | | |
| 六、注意事項： | | | |
| (1)請勿與 Cialis（犀利士）、Levitra（樂威壯）或 Viagra（威而鋼）併用。 | | | |
| (2)舌下錠—為確保藥效，請保存於廠商提供之棕色瓶內，不可分裝，取用後請儘速栓緊瓶蓋，避免揮發；開封後六個月，未使用的藥粒應丟棄，並請醫師新開一瓶。 | | | |
| (3)硝酸甘油放久可能失效，請記得定期回診，並告訴醫師您的胸痛頻率、嚴重度是否減輕。 | | | |
| (4)所有日常活動請遵照醫師指示，如：戒煙、戒酒、控制體重、減少劇烈運動等。 | | | |
| (5)硝酸甘油可能引起頭暈，做危險性工作（如開車、操作機械）時應小心。 | | | |
| (6)請隨時確認您手邊的藥量是否足夠，尤其是假期前或旅行前。 | | | |

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)

(7)孕婦或授乳婦用藥前請先告知醫師。

(8)以前曾因使用硝酸鹽製劑而引起不良反應者，請先告知醫師。

(9)請先告知醫師目前正在服用的其他藥品（包括指示用藥與成藥），尤其是降血壓藥及鎮靜劑。

七、藥品該如何存放？

舌下錠－室溫下（15~30°C）保存。不使用時或使用後需拴緊瓶蓋，置於兒童拿不到的地方。不可放棉花或其他物質於瓶內。開封後半年，未使用的藥粒應丟棄。

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)