

安泰醫療社團法人安泰醫院 藥劑科衛教單張

ZITHROMAX 懸浮液用藥指導衛教單

編號：X131

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(每錠)
日舒懸液用粉	ZITHROMAX	Azithromycin	40mg/ml,15ml/bot

二、作用：

本類藥是治療細菌感染的抗生素。

三、如何服用本藥品：

- (1)請遵照醫師指示服用。平均分配服藥間隔，固定時間服藥。如果睡覺時無法起床服藥，可將睡覺時間當一間隔，其餘時間均分。
- (2)可與食物或牛奶併服減少胃腸不適。但日舒懸液用粉(Zithromax Suspension)不可與含鋁或鎂的制酸劑併服，可能會減少抗生素藥效。

四、若忘記服藥該怎麼辦？

想起時儘快服用，若想起時已接近下一次服藥時間，則跳過一次，按照原來服用時間用藥，不可一次服用兩倍劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
反胃、食慾喪失、噁心、嘔吐、胃抽筋、便秘、特殊味覺、消化不良、糞便變軟、頭痛等	情形嚴重或持續時，請告知醫師
皮疹、蕁麻疹、搔癢、呼吸困難、胸痛、心悸、血便、不正常出血或瘀傷、尿液變黑、皮膚或眼睛顏色變黃、嚴重胃痛或其它嚴重不適	請停藥，並立即就醫

六、注意事項：

- (1)請遵照醫師指示的服藥天數將其服用完，不可擅自停用，否則可能復發。(2)如有下痢，不可自行服用止瀉藥，請告知醫師。
- (3)服用日舒懸液用粉(Zithromax Suspension)要避免長期曝曬陽光。
- (4)服用日舒懸液用粉(Zithromax Suspension)前，如有懷孕、哺乳、肝腎疾病或有服用其它藥物要告知醫師。

七、藥品該如何存放？

- (1)日舒懸液用粉(Zithromax Suspension)泡製後請放在室溫保存，室溫下可存放5天，超過5天如有未用完的部份請丟棄。
- (2)置於室溫乾燥處、勿直接照射光線，不要冷藏或冷凍，同時避免放在孩童可取得的場所。

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)

1353(急診藥局)(24小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail : ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)