

安泰醫療社團法人安泰醫院 藥劑科衛教單張

諾快寧口服懸液用粉劑 用藥指導衛教單

編號：X132

一、您目前所服用之藥品：

中文名	英文名	成分名	劑量(ML)
諾快寧口服懸液用粉劑	Curam powder for suspension	Augmentin	312.5mg/5ml

二、作用：

用於治療細菌感染的抗生素。

三、如何服用本藥品：

- (1)請遵照醫師指示服用，諾快寧口服懸液用粉劑建議於用餐開始時服用。
- (2)諾快寧口服懸液用粉劑，使用前應搖勻；泡製後請置於冰箱冷藏。

諾快寧口服懸液用粉劑泡製：

- 1.找到瓶身凹痕處，搖晃瓶身使粉末鬆散
- 2.用量杯加入 10ML 冷開水，蓋上瓶蓋用力搖晃，使其均勻
- 3.再加入冷開水至瓶身標示凹痕處，搖動使均勻，泡製後置入冰箱冷藏儲存
- 4.每次使用搖動均勻後，依醫師指示服用

四、若忘記服藥該怎麼辦？

想起時儘快補服，若已接近下次服藥時間就不用補服，按原來時間服用下一次劑量，不可一次服用兩倍的劑量。

五、可能產生的副作用及處理方式：

症狀	如何處理
噁心、嘔吐、腹瀉、喉頭炎	若情況嚴重或持續二天以上，應告知醫師
呼吸困難、氣喘、蕁麻疹、發紅、癢等症狀	請停藥，並立即就醫

六、注意事項：

- (1)治療期間即使感染症狀消失，不可擅自停藥，仍需繼續使用，完成整個療程才能根治，否則可能會復發。
- (2)服用本藥前有下列事項請告知醫師：曾有藥物過敏、懷孕或授乳、其它疾病（氣喘、枯草熱或腎臟病等）或服用其他藥物。讓醫師決定應否用藥。
- (3)安滅菌糖漿用粉劑可能降低某些口服避孕藥的作用，若同時服用，應採取其他避孕措施。藥品可能會引起腹瀉、噁心、嘔吐或皮疹。

七、藥品該如何存放？

諾快寧口服懸液用粉劑應貯存於密封容器中，置於 25°C 以下之乾燥處。
配置後的懸浮液應貯存於冰箱（2-8°C），並在七天內使用。

本藥品其他相關詳細問題，歡迎詢問醫師或藥師

諮詢專線：(08) 8329966 轉 1350, 1351(門診藥局)/1360, 1361(住院藥局)
1353(急診藥局)(24 小時服務)

諮詢電子信箱 [E-mail: ud@mail.tsmh.org.tw](mailto:ud@mail.tsmh.org.tw)